

## NIEUWE VOGELS IN DE KWEEKRUIMTE

*Dr John R Baker*

Onderzoek heeft uitgewezen dat het uitbreken van één of andere besmettelijke ziekte bij een stam grasparkieten, meestal het gevolg is van het aankopen en inbrengen van nieuwe vogels. Het doel van dit artikel is een aantal zaken naar voor brengen om dit zo veel mogelijk te vermijden.

Het aantal ziekten die een stam grasparkieten kan besmetten is groot en door voortdurend onderzoek in binnen- en buitenland, worden er elk jaar nog meer ontdekt. Ziekten die niet meteen in ons land aan de orde zijn, kunnen, door aankopen in verre landen, toch bij ons binnengebracht worden. Sommige van die ziekten kunnen op een eenvoudige manier behandeld worden, maar anderen zijn zo ernstig en zo weinig bekend, dat niet zelden hele stammen grasparkieten uitgeroeid worden.

Veruit de meest voorkomende oorzaak van het uitbreken van een besmettelijk ziekte in het introduceren van vers bloed. De vogels kunnen er perfect gezond uitzien, terwijl ze toch drager kunnen zijn van wat voor onheil ook. Dit kan het geval zijn op twee manieren: ofwel zijn de ziektekiemen in zodanig klein aantal aanwezig dat ze geen symptomen veroorzaken, ofwel kan de vogel in kwestie immuun zijn voor de ziekte. Maar in beide gevallen is hij wel drager. Wanneer een vogel gestresseerd is, kan hij er onderdoor gaan, waardoor grote hoeveelheden besmet materiaal op zoek gaat naar een nieuwe gastheer. Ook als de vogel in kwestie niet ziek wordt, zullen de anderen, die voor het eerst met de bacterie geconfronteerd worden, nog niet immuun zijn en ziek worden.

De gewoonte die de meeste kwekers hebben om nieuwe vogels meteen onder te brengen in de vluchten of meteen in de kweekkooi, kan desastreuze gevolgen hebben. Dit is niet alleen gewoon dom te noemen, maar wordt door ieder weldenkend kweker van om het even welk dier, niet gedaan. Aan onze universiteit hebben we talrijke uitbraken van besmettelijke ziekten bij stammen grasparkieten onderzocht. De gevolgen waren soms zodanig, dat kwekers ontgoocheld de hobby de rug toekeerden. Bij meer dan de helft van de gevallen, was kort voordien nieuw bloed in de stam ingebracht...

De enig goede manier om zulke toestanden te vermijden, is nieuwe vogels in quarantaine plaatsen, waar ze ook vandaan komen. Het is niet omdat je een vogel aankoopt bij je beste vriend, dat de vogel veilig is. In quarantaine plaatsen doe je dus niet in de kweekruimte, want veel ziekten kunnen net zo goed overgebracht worden zonder di-

rect contact tussen de vogels. Sommige bacteriën kunnen zich bijvoorbeeld gewoon verspreiden via het veerstof of de lucht. Quarantaine moet dus op een andere plaats gebeuren. Een tuinhuisje, een hobbykamer, noem maar op, zo ver mogelijk weg van de andere vogels. Daar de quarantaine zeker 3 à vier weken moet aangehouden worden, is de keuken van moeder de vrouw niet aangewezen. Ideaal zou zijn dat de nieuwe vogels verzorgd worden door iemand anders dan de kweker, want ook via die weg kunnen ziektekiemen worden overgebracht. Indien het toch niet anders kan, wat meestal het geval is, is het aangewezen eerst de onderhoudswerkzaamheden bij de stam te doen en pas achteraf bij de vogels in quarantaine.

Eveneens een goed idee is het dragen van aparte kledij in de kweekruimte en bij de quarantainevogels. Na dit alles handen ontsmetten. Kortom, hygiëne op zijn best en na de quarantaine de gebruikte kooien en alle materiaal eveneens een goede ontsmettingsbeurt geven is zeker aangewezen.

Tijdens de quarantaineperiode kunnen besmette vogels ziek worden en sterven, maar het risico op overdracht naar de stam is in elk geval voor een groot deel voorkomen. Dit is echter niet het enige voordeel van quarantaine. Het is ook de ideale gelegenheid om tijdens die periode vogels te behandelen. Zichtbare kwalen zoals schurft kunnen perfect behandeld worden binnen die tijd. Ook kan een ontwormingskuur toegepast worden. Er bestaat zelfs een mogelijkheid om de vogel te laten testen op allerlei verborgen kwalen, alhoewel dit natuurlijk een vrij dure aangelegenheid is, en wellicht enkel gedaan wordt bij topklasse vogels en dure stammen. Aan de andere kant zou wellicht iedere kweker die met de gebakken peren zit, meteen instemmen om het de volgende keer toch maar volgens de regels van de kunst te doen. Onderzoek van het bloed en de uitwerpselen zullen al heel wat wijsheid brengen. Ik begrijp wel dat mensen die regelmatig nieuwe vogels inbrengen dit niet zien zitten, financieel noch praktisch. Maar kwekers die maar heel af en toe eens een nieuwe vogel wensen in te brengen, omdat ze over een zeer consistente en kwaliteitsvolle stam beschikken die niet vaak vers of beter bloed vereist, is dit zeker aan te raden en de kosten meer dan waard.

Strikt genomen is het in quarantaine plaatsen zeker een must. Een kleine moeite die veel miserie kan voorkomen en een gewoonte die meteen bijdraagt tot de algehele gezondheid van onze vogels.

© Dr John R Baker.